



「未破裂脳動脈瘤クリッピング術パス」患者用

患者さんには、治療計画に基づいた医療をおこないます。

説明年月日： 年 月 日

項目	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
イベント	手術前日	手術当日	ICU入室中	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目以降	術後7日目	術後8日目
食事	通常は21時まで食事ができます	通常は0時より飲水できません	食事も飲水もできません 	朝より飲水可能です 		朝より常食へ変更となります			
	麻酔科医師の指示に従ってください			昼食より全粥食開始になります	全粥食をご希望の方はお知らせ下さい				
清潔	制限はありません ※シャワー浴をして下さい 	朝の洗面後、歯ブラシをICUへの持ち物に入れて下さい 	手術のため実施できません	体拭きを行い、着替えをします 	シャワーができます ※医師が創部ガーゼをはがしたら、抜鉤前でも洗髪できます  				
	制限はありません	手術室まで歩いて行きます 弾性ストッキングを着用して下さい 	ベッドを30度上げることが出来ます。起き上がることはできません	ドレーン挿入中はベッド上で過ごして下さい ドレーン抜去後、医師の指示で歩行できます 初回歩行時は看護師と一緒に歩きます 	歩行できます また、歩行開始となったら弾性ストッキングは脱いでかまいません 				
排泄	制限はありません	手術に行く10分前までにお手洗いを済ませて下さい	尿道カテーテルを留置します	歩行ができるようになったら尿道カテーテルを抜きます。トイレに行けます					
検査処置点滴	採血をします 	 手術が午後からの方は朝から点滴をします	 抗生剤の点滴があります	採血をします 午前中にCT・レントゲン施行後病棟へ戻ります  		採血します 		創部の抜鉤をします CT検査をします 	退院後、創部から出血したり膿が出てきた場合、外来ケアルームへ(休日、夜間は救急外来へ)お問い合わせ下さい
			食事摂取量に合わせ点滴を調整します						
内服薬	担当者が内服薬の確認をします 	当日内服指示がある場合は、少量の水で内服します。内服薬は、担当の看護師がお渡しします		医師の指示に従い内服を開始します			退院までに担当者が、内服薬について指導します 	退院時、次回外来までの内服薬を渡します	
	入院中の内服は主治医の指示に従ってください				<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p>このような症状がでた際は、ナースコールでお知らせ下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・気持ちが悪い・息苦しい・寒気がする ・お腹が痛い・頭痛や創痛が強くて辛い ・手足がしびれる、力が入りにくいなどの症状 <p>安静中の体の向き変えや腰痛等で辛い時、お知らせ下さい 看護師が体位調整のお手伝いをします</p>  </div>				
説明	※主治医より入院時の説明と担当看護師より病棟内の説明をします ※主治医が手術の説明をします ※夕方、麻酔科医師と手術室看護師が病室に説明に伺います	<div style="border: 2px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p>※手術の説明は必ずご家族同席となります。 入院日(手術前日)は、ご家族と一緒に来院されるようお願いいたします</p> <p><手術当日のお願い> ご家族の来院が必要です 手術終了まで院内待機をお願いいたします</p> </div>					※退院日は、治療後の身体状況を主治医が診て判断します 	※10時前後に会計伝票を事務職員がお渡しします 会計伝票を持ち外来棟1階でお会計を済ませ、伝票控えを担当看護師にお渡し下さい 	

患者さんの状態により、スケジュール内容が多少異なる場合があります。経過についてはその都度、個別にご説明いたします。